



ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.03.2017

Вознесенськ

65р

Про вдосконалення заходів
з йодної профілактики населення
30-кілометрової зони навколо
ВП "Южно-Українська АЕС"
ДП НАЕК "Енергоатом"

Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації № 394-р від 20.12.2013 «Про заходи з йодної профілактики населення 30-кілометрової зони навколо ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», рекомендації обласного управління охорони здоров'я та з метою забезпечення населення Об'єднаних Територіальних Громад, яке проживає в 30-кілометровій зоні навколо ВП "Южно-Українська АЕС" препаратами стабільного йоду у випадку виникнення аварії на енергетичних блоках:

1. Доручити головному лікарю КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» (Жарській Г.А.):

1.1. Провести та затвердити розрахунок сил та засобів, які планується залучити для організації та проведення йодної профілактики населення Об'єднаних Територіальних Громад Вознесенського району, яке проживає в 30-кілометровій зоні навколо ВП "Южно-Українська АЕС".

1.2. Організувати видачу 10-добової норми калію йодид населенню Об'єднаних Територіальних Громад Вознесенського району, яке проживає в 30-кілометровій зоні навколо ВП "Южно-Українська АЕС" відповідно до норм вживання (додаток 1).

1.3. Організувати та провести навчання з медичними працівниками, які будуть залучатись до забезпечення населення препаратом калію йодид.

1.4. Здійснювати контроль за станом здоров'я населення у випадку радіаційного забруднення території 30-кілометрової зони навколо ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Панову Т.М.

Голова Вознесенської
райдержадміністрації

Н.Ю. Баланюк

Додаток 1
до розпорядження голови
Вознесенської райдержадміністрації
від 14.03.2014 № 65-р

Норми вживання препарату калію йодид на добу
(Затверджено розпорядженням голови Миколаївської обласної
державної адміністрації від 20.12.2013 року № 394-р)

Дітям віком від 3-х місяців до 2 років - 0,04 гр. (1/6 пігулки) – 1 раз на добу;
Дітям віком від 2-х до 5-ти років - 0,125 гр. (0,5 пігулки) – 1 раз на добу;
Дітям від 5-ти років та дорослим - 0,250 гр. (1 пігулка) – 1 раз на добу.

1. Запас препарату калію йодид для проведення йодної профілактики населення повинен вистачати на 10 діб.
